

تأثیر روش‌های مختلف پخت بر تغییرات اکسیداسیون چربی، ترکیب فلزات سنگین و ویژگی‌های حسی ماهی هامور معمولی *Epinepheluscoioides*

زهرا مومن زاده^۱، آی ناز خدانظری^{۲*}، کمال غانمی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۲- استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۳- استادیار گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

(تاریخ دریافت: ۹۳/۱۲/۱۰ تاریخ پذیرش: ۹۴/۲/۱۰)

چکیده

در این مطالعه، تأثیر روش‌های مختلف پخت بر ترکیبات اکسیداسیون چربی و فلزات سنگین و خواص حسی فیله‌های ماهی هامور (*Epinepheluscoioides*) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پخت ماهی هامور طبق تکنیک‌های معمول مصرف کننده تهیه شد: آپیز، بخار پز، سرخ کردن تابه‌ای (بدون افزودن روغن)، سرخ کردن عمیق (در روغن زیتون) و مایکروویو. میزان تیوباربیتوریک اسید در فیله‌های پخته شده با روش‌های آپیز، بخاریز، سرخ کردن تابه‌ای و سرخ کردن عمیق‌تر از ۳ بیلی گرم مالون آلدید بر کیلوگرم گوشت بود. میزان اسیدهای چرب آزاد فیله‌ها با روش‌های مختلف پخت در مقایسه با ماهی خام به طور معنی داری کاهش یافتند. کمترین میزان اسیدهای چرب آزاد مربوط به نمونه‌های مایکروویو بود. بیشترین غلظت نیکل در نمونه‌های خام وجود داشت. میزان کروم و سرب در نمونه‌های خام و پخته شده تفاوت معنی داری نداشتند. غلظت کیالت و کادمیوم در همه نمونه‌ها زیر محدوده شناسایی بود. نتایج خواص حسی نشان داد که بافت، بو، مزه رنگ و پذیرش کلی در روش پخت سرخ کردن تابه‌ای و عمیق افزایش یافت و تفاوت معنی داری بین روش‌ها آپیز، بخاریز وجود نداشت.

کلید واژگان: *Epinepheluscoioides*، روش‌های پخت، تیوباربیتوریک اسید، اسیدهای چرب آزاد، فلزات سنگین، خواص حسی

* مسئول مکاتبات: khodanazary@yahoo.com

از مزایای غذاهای دریایی مقدار بالای پروتئین و مقدار اندک چربی می‌باشد. ارزش غذایی ماهی ممکن است از طریق روش‌های مختلف فرآوری یا روش‌های پخت تحت تاثیر قرار گیرد. تاثیر روش‌های مختلف پخت بر کیفیت مغذی مانند آنالیز تقریبی و اکسیداسیون چربی در ماهیان مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است [۳، ۸]. حرارت عامل اکسیداسیون چربی ماهیان می‌باشد که منجر به تغییر کیفی فرآورده‌های دریایی می‌گردد. عضله تیره در مقایسه با عضله سفید مقدار بیشتری چربی غیر اشباع دارد که در نتیجه مقدار عوامل پیش اکسیداسیون^۱ مانند آهن و پروتئین هم نیز در عضله تیره در مقایسه با عضله سفید بیشتر باشد [۴]. آلودگی محیط‌های آبی با فلزات سنگین به عنوان یکی از مسائل جدی در چند سال اخیر مطرح است. ماهیان موجود در محیط‌های دریایی به دلیل آلودگی با نفت و فاضلاب‌های صنعتی و خانگی در معرض فلزات سنگین می‌باشند که برای سلامت انسان مضر می‌باشد [۹]. فلزات سنگین در غلاظت‌های بالا به دلیل سمیت و تجمع در بافت برای تمام موجودات زنده بسیار خطرناک هستند [۱۰]. بنابراین، تعیین غلاظت فلزات سنگین در ماهیان به منظور ارزیابی ریسک خطر مصرف ماهی در سلامت انسان دارای اهمیت می‌باشد [۳]. مطالعات بسیاری جهت تعیین میزان فلزات سنگین در عضله ماهیان پخته شده انجام شده است که روش‌های مختلف پخت ماهی سی باس تغییری در غلاظت سرب، کروم، کادمیوم و کبالت را در مقایسه با ماهی خام نداشتند ولی میزان نیکل در ماهیان پخته شده در مقایسه با ماهی خام افزایش یافت [۱۲]. تاثیر روش‌های مختلف پخت روی اکسیداسیون چربی، میزان فلزات سنگین و ویژگی‌های حسی ماهی هامور انجام نشده است. بنابراین هدف از این مطالعه، تحقیق بر روی تغییرات خصوصیات اکسیداسیون چربی، فلزات سنگین و ارزیابی حسی ماهی هامور (*Epinepheluscoioides*) با استفاده از روش‌های مختلف پخت (آب پز، بخار پز، سرخ کردن تابه‌ای، سرخ کردن عمیق و مایکروویو) بود.

6. Pre-oxidation

۱- مقدمه

ماهی هامور (*Epinepheluscoioides*) یکی از گونه‌های ماهیان دریایی بالرزش اقتصادی در دریای عمان و خلیج فارس می‌باشد. این ماهی به دلیل داشتن گوشت خوش طعم و بافتی منسجم و سفید رنگ بسیار مورد توجه مصرف کنندگان ایرانی به ویژه جنوب کشور می‌باشد. ماهی هامور دارای بیش از ۵ درصد چربی در عضله می‌باشد که جزو ماهیان چرب محسوب می‌گردد [۱]. انجمان قلب آمریکا، استفاده حداقل ۲ بار ماهی در هفته را برای جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی توصیه می‌کند [۲]. در جوامع مدرن گوشت تقریباً همیشه پیش از مصرف پخته می‌شود. حرارت دهی یکی از روش‌های متدائل در فرآوری مواد غذایی است. گرما (آپز، بخارپز، سرخ کردن، مایکروویو و ...) در مواد غذایی منجر به غیر فعال شدن فعالیت میکروارگانیسم‌ها بیماری زا و آنزیم‌های لیپولیتیک، بهبود کیفیت حسی (بو و طعم)، افزایش قابلیت هضم و افزایش ماندگاری می‌گردد [۳، ۴]. هر چند که استفاده از حرارت می‌تواند منجر به تغییرات نامطلوب مانند کاهش ارزش تغذیه‌ای غذایی، کاهش رطوبت و دناتوره شده پروتئین‌ها به ویژه پروتئین‌های میوفیبریل گردد [۵]. بیشترین تغییرات مسائل کیفی در تولیدات ماهی پخته شده در ارتباط مستقیم با کیفیت ماده خام اولیه است [۵]. روش‌های مختلف پخت بر خصوصیات کیفی ماهیان از جمله بافت، طعم، بو، رنگ و پذیرش کلی تاثیر دارد [۶]. به طور کلی روش‌های پخت را به ۳ دسته تقسیم می‌کنند: ۱- حرارت خشک: در این روش غذا با هوا یا روغن داغ یا (سرخ کردن تابه‌ای^۱، سرخ کردن عمیق^۲، گریل کردن^۳) پخته می‌شود. ۲- حرارت مرطوب: در این روش غذا با مایع (معمولًا آب یا بخار آب) مانند آب پر کردن^۴، بخار پر کردن^۵ پخته می‌شود. ۳- روش‌های ترکیبی پخت که ترکیب روش‌های حرارت خشک و حرارت مرطوب مانند می‌باشد [۷].

1. Pan- frying
2. Deep- frying
3. Grilling
4. Poaching
5. Steaming

سرخ کردن تابه ای: فیله های ماهی را به تابه ای با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد منتقل و بخش استخوانی فیله را به مدت ۳ دقیقه در تابه سرخ شدند و سپس از بخش پوست، فیله ها را به مدت ۳ دقیقه سرخ شدند (بدون اضافه کردن روغن).

سرخ کردن عمیق: نمونه فیله ماهی را در سبد سیمی توری شکل قرار داده و سپس در ماهیتابه محتوی روغن زیتون با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند تا ماهی سرخ شد.

مايكروویو: نمونه های فیله ماهی در صفحه شیشه ای قرار گرفتند و دستگاه مايكروویو (CE3260E Model, SAMSUNG) را روی قدرت ۱۰۰٪ (بالا) تنظیم و در مدت ۴۰ ثانیه نمونه ها پخته شدند. بعد از پخت، نمونه ها روی حوله جاذب قرار داده شدند.

بعد از اتمام فرآيند پخت، نمونه ها در دمای اتاق خنک شدند. نمونه های خنک شده در کيسه های فریزی در دمای -۸۰- درجه سانتی گراد تا زمان آنالیز قرار گرفتند. قبل از انجام آنالیزها، پوست و استخوان از فیله پخته شده جدا گردیدند. تمام نمونه ها در هر روش پخت با استفاده از همزن آشپزخانه همگن شدند. از هر تیمار مورد آزمایش، ۳ تکرار در نظر گرفته شد. اندازه گیری فاکتورهای کیفی چربی (تیوباریتوريک اسید(TBA)⁸) و اسیدهای چرب آزاد (FFA)⁹) و ترکیب فلزات سنگین پس از پخت فیله ماهی هامور انجام شدند. همچنین نمونه خام و پخته شده به منظور ارزیابی خواص حسی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند.

۲-۳-۲- اندازه گیری خواص کیفی چربی

۱-۳-۲- اندازه گیری تیوباریتوريک اسید

این شاخص طبق روش Siripatrawan and Noiphap¹⁰ [۲۰۱۲] با افروden ۹۷/۵ میلی لیتر آب مقطر و ۲/۵ میلی لیتر اسید کلریدریک ۴ نرمال به ۱۰ گرم نمونه ماهی هموژن شده اندازه گیری شد. ۵ میلی لیتر از مایع حاصل از تقطیر این مخلوط به ۵ میلی لیتر معرف تیوباریتوريک اسید افزوده و به مدت ۳۵ دقیقه در دمای ۱۰۰ درجه قرار داده شد. پس از سرد شدن میزان

۲- مواد و روش کار

۱-۲- آماده سازی نمونه

ماهی هامور (*Epinepheluscoioides*) به صورت تازه از صیادان محلی منطقه آزاد ارونده شهرستان آبادان خریداری شدند. ماهیان بلافضلله در جعبه های یونولیتی حاوی یخ (نسبت ماهی به یخ ۱ به ۲ (وزنی / وزنی)) نگهداری و در مدت کمتر از ۲ ساعت به آزمایشگاه فرآوری واقع در دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر منتقل گردیدند. متوسط وزن و طول ماهی هامور به ترتیب ۱۶۵۶ گرم و ۳۶/۵ سانتی متر بود. به محض ورود ماهیان هامور به آزمایشگاه فرآوری، با آب سرد شسته و سرزنشی و تخیله امعا و احشا شدند. از هر ماهی دو فیله بدون خارج کردن استخوان تهیه شد. ۱۰۰ گرم نمونه از بخش فوقانی⁷ خط جانبی فیله ماهی جهت پخت مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۲- روش های مختلف پخت

سپس نمونه های فیله ماهی طبق روش AOAC ۹۷۷۱۶ (دستورالعمل پخت غذاهای دریایی) پخته شدند^[۱۳]. روش های پخت انتخاب شده در این تحقیق، روش های معمول فرآوری ماهی توسط مصرف کنندگان ایرانی بودند که شامل آب پز کردن، بخارپز کردن، مايكروویو، سرخ کردن تابه ای و سرخ کردن عمیق می باشند^[۱۳].

بخارپز کردن: فیله های ماهی در بخارپز استیل ضدزنگ، محتوی ۵۰۰ میلی لیتر آب جوش، بر روی ظرف های ضد زنگ قرار گرفتند و درب بخارپز گذاشته شدند. نمونه های فیله ماهی در بخارپز به مدت ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه قرار گرفتند تا فیله ها در نتیجه حرارت بخار آب پخته شدند. بعد از سپری شدن زمان پخت، فیله ها روی پارچه جاذب قرار گرفتند.

آب پز کردن: فیله های ماهی در ظرف ضد زنگ، محتوی ۵۰۰ میلی لیتر آب جوش قرار گرفتند. درب ظرف محتوی نمونه ماهی کاملا بسته شدند. مدت زمان پخت ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه بود. بعد از سپری شدن زمان پخت، فیله ها روی پارچه جاذب قرار گرفتند.

8. Thiobarbituric acid
9. Free fatty acid

7. Anatomical section

گراد افزایش داده شد تا دمای کوره به ۴۵۰ درجه سانتی گراد برسد. سپس نمونه‌ها به مدت ۸ ساعت در این دما نگهداری شدند. نمونه‌های خاکستر شده را با ۱-۳ میلی لیتر آب مقطر مرطوب کرده و جهت تبخیر شدن بر روی هات پلیت قرار گرفت و مجدداً نمونه‌های خاکستر شده را در کوره به مدت یک تا دو ساعت در دمای کمتر از ۲۰۰ درجه سانتی گراد قرار داده شدند و دمای کوره به ازای هر یک ساعت، ۵۰-۱۰۰ درجه سانتی گراد بالا برده شد تا دما به ۴۵۰ درجه سانتی گراد رسید. نمونه‌ها به مدت دو ساعت نیز در این دما نگهداری شدند. ۵ میلی لیتر HCl ۶ مولار را به بوته چینی اضافه شد تا خاکسترها از دیواره بوته چینی با اسید حل گردیده و نمونه‌ها روی هات پلیت قرار داده شدند تا اسید تبخیر شود. به منظور هضم، نمونه‌ها به همراه ۱۰-۳۰ میلی لیتر^۳ HNO₃ ۰/۱ مولار حل گردید. پس از پوشاندن درب بوته‌های چینی، نمونه‌ها به مدت ۱-۲ ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند. سپس نمونه‌ها از کاغذ صافی عبور داده شدند و در ظروف پلاستیکی نگهداری گردیدند. در نهایت میزان فلزات سنگین موجود در نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی (GBC Model, Australia) سنجش شدند.

۵-۲- ارزیابی حسی

ارزیابی نمونه‌ها توسط ۱۰ نفر گروه ارزیاب آموزش دیده‌دار دامنه سنی ۲۳ تا ۲۸ سال انجام پذیرفت. ۱/۵ درصد نمک به نمونه‌های ماهی اضافه گردید و سپس از طریق روش‌های مختلف پخت، فیله ماهیان پخته شدند. بافت، طعم، بو، رنگ و پذیرش کلی نمونه‌ها با مقیاس هدونیک^{۱۲} [۱۷] با اندازه تغییر با اصطلاحات توصیفی ذیل رتبه بندی شدند: بافت (۵، سفتی^{۱۳}، قابلیت جویدن^{۱۴} و خاصیت اجتماعی^{۱۵})، رنگ (۵، رنگ زرد طلائی روشن، ۱، حالت نیمه شفاف)، طعم (۵، مطلوب، ۱، کاملاً نامطلوب)، بو (۵، مطبوع، ۱، کاملاً نامطبوع)، پذیرش کلی (۵، خیلی خوب، ۱، خیلی بد) [۶].

جذب مایع صورتی حاصل در طول موج ۵۳۸ نانومتر در دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. عدد جذب خوانده شده در ثابت ۷/۸ ضرب شد تا میزان تیوباربیتوریک اسید نمونه بدست آید (رابطه (۱)). میزان تیوباربیتوریک اسید بصورت میلی‌گرم مالون آلدید اکیوالان بر کیلوگرم نمونه بیان شد.

رابطه (۱)

$$\text{TBA}_{\text{value}} = 7.8 \text{ Abs}_{538} \\ \text{میزان جذب در طول موج ۵۳۸ نانومتر} = \text{Abs}_{538}$$

۲-۳-۲- اندازه گیری میزان اسیدهای چرب آزاد

میزان شاخص اسیدهای چرب آزاد با استخراج چربی از ۱۰ گرم نمونه گوشت با کمک کلروفرم / متانول به روش et al.,^{۱۵} و تیتراسیون گروههای کربوکسیلیک آزاد موجود در آن با هیدروکسید سدیم صورت پذیرفت. کلروفرم، متانول و ۲-پروپانول به نسبت ۲:۱:۲ به همراه معرف متاکروزول ارغوانی به عصاره استخراج شده اضافه شد و تیتراسیون تا تغییر رنگ از زرد به آبی ادامه یافت. این شاخص با قرار دادن در رابطه (۲) اندازه گیری شد. نتایج بصورت درصد اولنیک اسید^{۱۰} بیان شد.

رابطه (۲)

$$\text{FFA} = \frac{\text{N} \times (\text{V}_2 - \text{V}_1) \times 2.82}{\text{W}} \\ \text{N} = \text{NaOH}$$

V_2 = مصرفی برای هر نمونه NaOH میلی لیتر

V_1 = مصرفی برای نمونه شاهد (بلانک)^{۱۱} NaOH میلی لیتر

W = وزن چربی (گرم)

۴-۲- اندازه گیری فلزات سنگین


سنجدش فلزات سنگین (کبات، نیکل، کروم، سرب و کادمیوم) طبق روش (۲۰۰۲) AOAC^{۱۶} انجام گردید. ۱۵ گرم نمونه خشک شده را در هاون چینی پودر و در کوره (شرکت خودساز، ایران) با دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت قرار داده شدند. به ازای هر یک ساعت، دمای کوره ۵۰ درجه سانتی

12. Hedonic
13. Firmness/ Toughness
14. Chewiness
15. Springiness

10. Oleic acid
11. Blank

باشد. در روش های آپز، بخارپز سرخ کردن تابه ای و سرخ کردن عمیق، مالون آلدهید تولید شده طی اکسیداسیون چربی می تواند یا از طریق حل شدن در آب و یا در نتیجه اتصال با پروتئین ها کاهش یابد [۵۸]. مطالعه مشابهی در مورد تاثیر روش های مختلف پخت ماهی بر تغییرات تیوباربیتوریک اسید توسط [۸]Weber et al., 2008 گزارش گردید.

مقادیر بالای ۳-۴ میلی گرم مالونآلدهید بر کیلوگرم، کیفیت پایین محصولات را نشان می دهد [۲۰]. در مطالعه انجام شده میران تیوباربیتوریک اسید در تمام نمونه های خام و پخته شدهایین تر از حد استاندارد بود.



شکل ۱ تغییرات میزان تیوباربیتوریک اسید ماهی هامور طی روش های مختلف پخت

۲-۳- تغییرات اسیدهای چرب آزاد

وجود اسید چرب آزاد به واسطه اکسایش و آبکافت آنزیمی چربی های استری بوده و یک ترکیب نامطلوب می باشد چون اسیدهای چرب آزاد می توانند به ترکیبات فرار بدبو تبدیل شوند [۲۱، ۲۲]. با اینکه تولید اسیدهای چرب آزاد به خودی خود منجر به افت کیفیت تغذیه ای نمی شود اما آزمون میزان آبکافت چربی به نظر مهم می رسد چون آبکافت چربی در شرایط سرما نیز ادامه می یابد که تاثیر شدیدی بر اکسیداسیون چربی و دنا توره شدن پروتئین های میوفیبریل ترکیب شوند و منجر به دنا توره شدن پروتئین های می گردد [۲۳]. تأثیر پرواکسیدانی اسیدهای چرب آزاد بر چربی نیز گزارش شده است بدین صورت که اسیدهای

۶- آنالیز آماری


تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمون واریانس یک طرفه^{۱۶} بررسی شده و نتایج بصورت میانگین خطای معیار بیان شد. جهت انجام مقایسه میانگین های متغیرهای اکسیداسیون چربی، فلزات سنگین و ارزیابی حسی از آزمون دانکن در سطح احتمال ۰/۰۵ با استفاده از نرم افزار آنالیز آماری SPSS استفاده گردید. نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام گردید.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- تغییرات تیوباربیتوریک اسید

محصولات مواد اولیه اکسیداسیون (هیدروپراکسیدها) ناپایدار و مستعد تجزیه می باشند. محصولات ثانویه اکسیداسیون شامل آلدھیدها، کتونها، الکلها، هیدروکربنها، اسیدهای آلی و ترکیبات اپوکسی می باشد. مالون آلدهید یک ترکیب جزیی از اسیدهای چرب با سه پیوند دوگانه و یا بیشتر از آن است که در اثر تجزیه اسیدهای چرب چنان غیراشباعی طی اکسیداسیون چربی تشکیل می شود. این ماده معمولاً به عنوان شاخصی در ارزیابی روند تغییرات اکسیداسیون چربی استفاده می شود [۱۸]. به اثبات رسیده است که محصولات حاصل از اکسیداسیون چربی منجر به تصلب شراین، بیماری آنژایمر، سرطان، تورم و قرمزی و پیری می گردد [۱۹].

تغییرات میزان تیوباربیتوریک اسید ماهی هامور ناشی از پخت به شیوه های مختلف در شکل ۱ نشان داده شده است. میزان تیوباربیتوریک اسید نمونه خام ۱/۴۶ میلی گرم مالون آلدهید بر کیلوگرم گوشت بود. میزان تیوباربیتوریک اسید فیله ها پس از پخت با روش های مختلف پخت افزایش یافت که تفاوت معنی داری با نمونه خام نداشتند. بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید مربوط به روش پخت مایکروویو بود که میزان تیوباربیتوریک اسید برابر با ۳/۶۶ میلی گرم مالون آلدهید بر کیلوگرم گوشت بود. افزایش میزان تیوباربیتوریک اسید در این روش پخت ممکن است به دلیل بالا بودن نسبی دما در مقایسه با سایر روش ها



شکل ۲ تغییرات میزان اسید چرب آزاد ماهی هامور طی روش های مختلف پخت

۳-۳- تغییرات فلزات سنگین

غلظت فلزات سنگین در نمونه های خام و پخته شده طبق روش های مختلف در جدول ۱ نشان داده شده است. غلظت نیکل در فیله خام ماهی هامور $0.02 \mu\text{g}/\text{ml}$ بود. غلظت نیکل در تمام روش های پخت به جز سرخ کردن تابه ای با نمونه خام تفاوت معنی داری نداشت ($P > 0.05$). غلظت نیکل در نمونه بخارپز زیر محدوده شناسایی بود. در مطالعه Erosy و همکاران در سال ۲۰۰۶ [۱۳] که بر روی ماهی سی باس انجام گردیده است غلظت نیکل در نمونه های پخته شده تفاوت معنی داری نداشته است. مطالعه ای در مورد تاثیر روش های مختلف پخت ماهی هامور بر میزان فلزات سنگین انجام نشده است [۱۲]. غلظت کروم در نمونه های خام $0.40 \mu\text{g}/\text{ml}$ تعیین شد.

غلظت کروم در نمونه های خام و پخته شده تفاوت معنی داری نشان نداد ($P > 0.05$). میانگین غلظت کروم فیله ها در روش سرخ کردن عمیق دارای کمترین مقدار بود ($P < 0.05$). کاهش آب بافت منجر به افزایش غلظت یون ها می گردد. از طرف دیگر، پلی فنول های روغن زیتون با یون های فلزی در غذا ترکیب و بر روی توزیع یون ها بین روغن و غذا تاثیر می گذارد. بنابراین، غذاهای دریابی سرخ شده دارای کمترین میزان فلزات می باشند [۹].

چرب آزاد بر گروه کربوکسیل اثر تحریک کننده^{۱۷} داشته و تشکیل هیدروپروکسیدها و متعاقباً رادیکال های آزاد را تسريع می پخشند. علاوه بر این به دلیل کوچک بودن اندازه مولکول های اسید چرب آزاد نسبت به چربی های بزرگتر (مهترین آنها تری آسیل - گلیسیرون ها و فسفولیپیدها) بیشتر در معرض اکسیداسیون توسط آنزیم هایی چون لیپازها و فسفولیپازها می باشد. این مسئله به شدت بر کیفیت حسی فراورده های غذایی دریابی تاثیرگذار است [۲۶].

تغییرات میزان اسید چرب آزاد ماهی هامور طی روش های مختلف پخت در شکل ۲ نشان داده است. میزان اولیه شاخص اسید چرب آزاد در نمونه خام $6/12$ درصد اولئیک اسید بود. میزان اسید چرب آزاد نمونه خام پس از حرارت دادن به طور معنی داری کاهش یافت ($P < 0.05$). میزان اسید چرب آزاد در روش های بخارپز، آبپز، مایکروویو، سرخ کردن تابه ای و سرخ کردن عمیق به ترتیب $0/80$ ، $0/75$ ، $0/45$ و $0/70$ درصد اولئیک اسید بودند. کمترین میزان اسید چرب آزاد متعلق به روش پخت با مایکروویو بود که با دیگر نمونه های تفاوت معنی داری داشت ($P < 0.05$). بواسطه آبکافت فسفولیپیدها و تری گلیسیریدها توسط لیپاز و فسفولیپاز [۲۶] افزایش در تولید اسید چرب آزاد در نمونه های خام مشاهده شد اما در نمونه های پخته شده میزان اسید چرب آزاد کمتر بود. حرارت بالا در نمونه های فیله پخته شده منجر به غیر فعال نمودن آنزیم لیپاز میگردد که منجر به کاهش میزان اسید چرب آزاد در نتیجه پخت می گرددند [۸]. همچنین خارج شدن اسید چرب فرار در طی پخت ممکن است منتهی به کاهش اسید چرب آزاد گردد [۸]. مطالعه مشابهی در مورد تاثیر روش های مختلف پخت ماهی بر تغییرات توباربیتوریک اسید توسط Weber et al., 2008 [۸] گزارش گردیده است.

ای، سرخ کردن عمیق و مایکروویو شناسایی نشد (زیر محدوده شناسایی).

غلظت سرب در نمونه های خام $0.06 \mu\text{g}/\text{ml}$ بود. غلظت سرب فیله خام در مقایسه با فیله های پخته شده طبق روش های مختلف، تفاوت معنی داری نداشتند ($P > 0.05$).

غلظت کبالت در فیله خام و پخته شده طبق روش های مختلف زیر محدوده شناسایی بود. نتایج این مطالعه با نتایج Ersoyet 2006 [۱۲] مطابقت داشت.

غلظت کادمیوم در نمونه های خام، آپیز، بخارپز، سرخ کردن تابه

جدول ۱ میانگین غلظت فلزات سنگین فیله های خام و پخته شده ماهی هامور ($\mu\text{g}/\text{ml}$ ، وزن خشک)

سرب	کادمیوم	کبالت	کروم	نیکل	
0.06 ± 0.03	ND	ND	0.40 ± 0.10	0.02 ± 0.00^b	خام
0.05 ± 0.00	ND	ND	0.22 ± 0.22	ND*	بخار پز
0.08 ± 0.00	ND	ND	0.26 ± 0.26	0.03 ± 0.02^{ab}	آپیز
0.06 ± 0.03	ND	ND	0.25 ± 0.17	0.15 ± 0.07^a	سرخ کردن تابه ای
0.05 ± 0.00	ND	ND	0.17 ± 0.14	0.02 ± 0.01^b	سرخ کردن عمیق
0.04 ± 0.02	ND	ND	0.33 ± 0.17	0.06 ± 0.03^{ab}	مایکروویو

* Non detection

حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیمارها می باشد ($P < 0.05$).

تغییر طعم و رنگ فرآورده ها می گردد [۲۸]. تولید بو و طعم در محصولات پخته شده فرآیند پیچیده ای است که در نتیجه واکنش ترکیبات متفاوت، محصولات ثانویه یا ترکیبات فرار^{۱۸} تولید می گردد [۲۸]. ترکیبات فوران^{۱۹} عامل مهمی در تشکیل بوی خاص در محصولات سرخ کردنی می باشد. ترکیبات فوران (فوران^{۲۰}، ۲-فورفورال^{۲۱}، فورفوریل الكل^{۲۲}، ۲-پنتیل فوران^{۲۳}، ۵-هیدورکسی متیل فورفورال^{۲۴}) ناپایدار و منجر به ایجاد بوی مطلوب و دلپذیر می گردد [۲۸].

وقتی به بافت عضلانی حرارت داده می شود، الیاف آن محکم تر و بافت پیوندی سست تر می گردد. در نتیجه هنگام جویدن که نیرو به بافت پخته شده وارد می شود ابتدا ساختار بافت پیوندی تخریب می گردد [۲۹].

۳-۴- ارزیابی حسی

نتایج ارزیابی حسی نمونه های خام و پخته شده در جدول ۲ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود ویژگی بافت، بو، طعم، رنگ و پذیرش کلی در نمونه های سرخ شده تابه ای و عمیق دارای بیشترین امتیاز بودند که مطابق با نتایج قیومی جونایانی و همکاران در سال ۱۳۹۰ [۶] بودند. نمونه ها با امتیاز بالاتر از ۳ از مطلوبیت بالاتری برخوردار بودند. بررسی نتایج پذیرش کلی نمونه ها نشان داد که فیله سرخ شده تابه ای و عمیق دارای بیشترین امتیاز بود و بین نمونه های آپیز و بخار پز تفاوت معنی داری وجود نداشت ($P > 0.05$). همچنین بین نمونه خام و نمونه مایکروویو تفاوت معنی داری وجود نداشت ($P > 0.05$).

پختن گوشت به ویژه سرخ کردن منجر به تولید رادیکال های آزاد حاصل از اکسیداسیون چربی ها و تغییر طعم و بو می گردد [۲۷، ۲۸] که مطلوبیت خصوصیات حسی فیله ماهی پخته شده با توجه به نوع روش پخت متفاوت است. همچنین در نتیجه واکنش قهقهه ای شدن غیر آنریتمی، واکنش بین پروتئین ها و قندهای احیاء کننده گوشت انجام می گیرد و در نهایت منجر به

18. Volatile compounds

19. Furanic compounds

20. Furan

21. 2- Furfural

22. Furfurylalcohol

23. 2- Pentylfuran

24. 5- Hydroxymethylfurfural (HMF)

جدول ۲ خصوصیات حسی ماهی هامور طی روش‌های مختلف پخت

پذیرش کالی	رنگ	طعم	بو	بافت	
۱/۰۰±۰/۰۰ ^c	۱/۰۰±۰/۰۰ ^c	۱/۰۰±۰/۰۰ ^c	۱/۰۰±۰/۰۰ ^d	۱/۰۰±۰/۰۰ ^d	خام
۲/۷۰±۰/۳۳ ^b	۲/۵۰±۰/۴۵ ^{ab}	۲/۵۰±۰/۳۰ ^b	۲/۵۰±۰/۴۵ ^{bc}	۳/۰۰±۰/۳۹ ^{bc}	بخار پز
۲/۸۰±۰/۲۹ ^b	۲/۱۰±۰/۴۵ ^b	۲/۷۰±۰/۳۹ ^b	۲/۲۰±۰/۴۶ ^{bc}	۲/۸۰±۰/۳۲ ^c	آپز
۳/۴۰±۰/۳۳ ^{ab}	۳/۳۰±۰/۲۱ ^a	۳/۶۰±۰/۳۰ ^a	۳/۱۰±۰/۴۳ ^{ab}	۳/۸۰±۰/۳۲ ^{ab}	سرخ کردن تابه‌ای
۴/۱۰±۰/۳۴ ^a	۳/۵۰±۰/۴۲ ^a	۳/۷۰±۰/۱۰ ^a	۳/۹۰±۰/۳۷ ^a	۴/۰۰±۰/۳۳ ^a	سرخ کردن عمیق
۱/۲۰±۰/۱۳ ^c	۱/۱۰±۰/۱۰ ^c	۱/۴۰±۰/۱۶ ^c	۱/۵۰±۰/۱۶ ^{cd}	۱/۵۰±۰/۲۲ ^d	مايكروویو

حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیمارها می‌باشد .(P<0.05)

- [4] Yagiz, Y., Kristinsson, H. G., Balaban, M.O., Welt, B. A., Ralat, M., Marshall, M.R. 2009. Effect of high pressure processing and cooking treatment on the quality of Atlantic salmon. Food Chemistry. 116: 828- 835.
- [5] Rodríguez, A., Carriles, N., Cruz, J. M., Abourg, S.P. 2008. Changes in the flesh of cooked farmed salmon (*Oncorhynchus kisutch*) with previous storage in slurry ice (-1.5 °C).LWT- Food Science and Technology.41: 1726- 1732.
- [6] Ghauomi Jooyani, A., Khoshkhoo, Zh., Motallebi, A. A. Moradi, Y. 2011. The effect of different methods of fatty acid composition of tilapia, *Oreochromis niloticus*, fillets. Iranian Scientific Fisheries Journal. 20: 97- 108.
- [7] Moradi, Y., Bakar, J., Motalebi, A. A., SeyedMohamad, S.H., Che Man, Y. 2011. A review on fish lipid composition and changes during cooking methods.Journal of Aquatic Food Product Technology.20: 379- 390.
- [8] Weber, J., Bochi, V.C., Ribeiro, C.P., Victório, A.M., Emanuelli, T. 2008.Effect of different cooking methods on the oxidation, proximate and fatty acid composition of silver catfish (*Rhamdia quelen*) fillets. Food Chemistry.106: 140- 146.
- [9] Kalogeropoulos, N., Karavoltos, S., Sakellari, A., Avramidou, S., Dassenakis, M., Scoullos, M. 2012. Heavy metals in raw, fried and grilled Mediterranean finfish and shellfish.Food and Chemical Toxicology.50: 3702- 3708.
- [10] EmamiKhansari, F., Ghazi- Khansari, M., Abdollahi, M. 2005. Heavy metals content of canned tuna fish. Food Chemistry.93: 293- 296.

۴- نتیجه گیری کلی

مقادیر تیوباریتوريک اسید، اسیدهای چرب آزاد، فلزات سنگین و ارزیابی حسی در روش‌های مختلف پخت ماهی هامور مورد سنجش قرار گرفت. میزان تیوباریتوريک اسید نمونه خام با فیله‌های پخته شده با روش‌های مختلف به جز مایکروویو تفاوت معنی داری نداشتند. میزان تیوباریتوريک اسید فیله‌های آپز، بخارپز، سرخ شده تابه‌ای و سرخ شده عمیق پایین تر از حد مجاز بود. همچنین اسیدهای چرب آزاد در تمام روش‌های پخت در مقایسه با نمونه خام به طور معنی داری کاهش یافت. میزان نیکلاندازه گیری شده در روش سرخ کردن تابه‌ای در مقایسه با سایر روش‌های پخت افزایش نشان داد و سایر فلزات سنگین اندازه گیری شده در تمام روش‌های پخت تفاوت معنی داری نداشتند. همچنین ارزیابی حسی نشان داد که روش سرخ کردن تابه‌ای و عمیق دارای بیشترین مطلوبیت بود.

۵- منابع

- [1] Razai- Shirazi, H. Seafood Technology-principles of handling and processing (1). 2007.Nghshemehr press. 325 pages.
- [2] Ozogul, Y., Ozogul, F.Gokbulut, C. 2006. Quality assessment of wild European eel (*Anguilla anguilla*) stored in ice. Food Chemistry. 95: 458-465.
- [3] Ersoy, B., Özeren, A. 2009. The effects of cooking methods on mineral and vitamin contents of African catfish.Food Chemistry.115: 419- 422.

- [21] Rezaei, M., and Hosseini, S. F. 2008. Quality assessment of farmed rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) during chilled storage. *Journal of food science.* 73: H93–H96.
- [22] Ozyurt, G., Kuley, E., Ozkutuk, S., Ozogul, F. 2009. Sensory, microbiological and chemical assessment of the freshness of red mullet (*Mullus barbatus*) and gold band goatfish (*Upeneus moluccensis*) during storage in ice. *Food Chemistry.* 114: 505–510.
- [23] Aubourg, S. P. 1993. Interaction of malondialdehyde with biological molecules-new trends about reactivity and significance. *International journal of food science and technology.* 28: 323-335.
- [24] Pacheco-Aguilar, R., Lugo-Sánchez, M. E., Robles-Burgueño, M. R. 2000. Postmortem biochemical and functional characteristic of Monterey sardine muscle stored at 0 °C. *Journal of Food Science.* 65: 40- 47.
- [25] Losada V. Barros-Velazquez, J. Aubourg, S. P. 2007. Rancidity development in frozen pelagic fish: Influence of slurry ice as preliminary chilling treatment. *LWT.* 40: 991–999.
- [26] Rostamzad, H., Shabanpour, B., Shabani, A., Shahiri, H. 2011. Enhancement of the storage quality of frozen Persian sturgeon fillets by using of ascorbic acid. *International food research journal.* 18: 109-116.
- [27] Santé Lhtllier, V., Astuc, T., Marinova, P., Greve, E., Gatellier, P. 2008. Effect of meat cooking on physicochemical state and in vitro digestibility of myofibrillar proteins. *Journal of Agricultural and Food Chemistry.* 56: 1488-1494.
- [28] Pérez- Palacios, T., Petisca, C., Henriques, R., Ferreira, I.M.P.L.V.O. 2013. Impact of cooking and handling conditions on furanic compounds in breded fish products. *Food and Chemical Toxicology.* 55: 222- 228.
- [29] Razai- Shirazi, H. 2001. Seafood Technology- processing science (2). Ngshehr press. 292 pages.
- [11] Atta, M.B., El- Sebaie, L.A., Noaman, M.A., Kassab, H.E. 1997. The effect of cooking on the content of heavy metals in fish (*Tilapia nilotica*). *Food Chemistry.* 58: 1-4.
- [12] Ersoy, B., Yanar, Y., Küçükgülmez, A., Çelik, M. 2006. Effects of four cooking methods on the heavy metal at concentrations of sea bass fillets (*Dicentrarchus labrax* Linn, 1785). *Food Chemistry.* 99: 748- 751.
- [13] Larsen, D., Quek, S. Y., Eyres, L. 2010. Effects of cooking methods on the fatty acid profile of New Zealand King Salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*). *Food Chemistry.* 119: 785- 790.
- [14] Siripatrawan, U., Noiphap, S. 2012. Active film from chitosan incorporating green tea extract for shelf life extension of pork sausages. *Food Hydrocolloids.* 27: 102-108.
- [15] Woyewoda, A. D., Shaw, S. J., Ke, P. J., Burns, B. G. 1986. Recommended laboratory methods for assessment of fish quality. *Canadian Technical Report of Fish and Aquatic Science,* 1448p.
- [16] AOAC. 2002. *Official Methods of Analysis*, 13th edn. Washington DC, USA, 1094 pp.
- [17] ASTM. 1969. *Manual on sensory testing methods American society for testing and materials*, 1916 Race Street, Philadelphia, pa. 19103, 34-42.
- [18] Shahidi, F., Zhong, Y. 2005. Lipid oxidation: measurement methods (6th Ed.). Memorial university of Newfoundland, Canada. 357-385.
- [19] Broncano, J. M., Petrón, M.J., Parra, V., Timón, M.L. 2009. Effect of different cooking methods on lipid oxidation and formation of free cholesterol oxidation products (COPs) in *Latissimus dorsi* muscle of Iberian pigs. *Meat Science.* 83: 431- 437.
- [20] Karacam, H., Kutlu, S., Kose, S. 2002. Effect of salt concentrations and shelf life of brined anchovies. *International Journal of Food Science and Technology.* 37: 19-28.

**Effect of different methods of cooking on changes of oxidation lipid,
heavy metal composition and sensory properties of
*Epinepheluscoioides***

Momenzadeh, Z.¹, Khodanazary, A.^{2*}, Ghanemi, K.³

1. M.Sc student of Khorramshahr University of Marin Science and Technology

2. Assistant professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of
Marin Science and Technology

3. Assistant professor, Department of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of
Marine Science and Technology

(Received: 94/12/10 Accepted: 94/2/10)

In this study, the influence of different cooking method on the oxidation lipid and heavy metal composition and sensory properties of *Epinepheluscoioides* fillets was evaluated. Cooking of *Epinepheluscoioides* was prepared according to common consumer techniques: poached, steamed, pan fried (no added oil), deep fried (in olive oil) and microwave. Thiobarbituric acid (TBA) content was less than 3 mg MDA/ kg in cooked fillet with boiling, poaching, dry- frying and deep frying methods. The free fatty acid (FFA) content of the fillets was significantly reduced by the different cooking methods in compared with raw fish. There was the highest Ni concentration in raw samples. Co and cd concentrations were below limits of detection in all samples. The Cr and pb contents in the raw and cooked sapmles were not significantly different. The results of sensory properties were showed that the texture, odour, flavor, colour and overal likeness properties increased in pan- frying and deep- frying methods and there were not significantly different between boiling, poaching.

Keywords: *Epinepheluscoioides*, Cooking methods, TBA, FFA, Heavy metal, Sensory properties.

*Corresponding Author E-Mail Address: khodanazary@yahoo.com